

## **ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PEDIATRII**

### **W SPRAWIE WYKONYWANIA WYMAZU Z GARDŁA U DZIECI**

Wymazy z gardła pobiera się głównie w zakażeniach górnych dróg oddechowych. Wymaz należy pobrać (przed podaniem antybiotyku) z miejsc zmienionych chorobowo, przy nawracających zakażeniach po uciśnięciu krypty. W pobranych wymazach z gardła można bezpośrednio wykryć (przy pomocy szybkich i uproszczonych testów immunoenzymatycznych obecność antygenów *Streptococcus pyogenes* (*Streptococcus*  $\beta$ -hemolizujący grupy A)).

U dzieci niewykrycie antygeny nie upoważnia (w odróżnieniu od dorosłych) do wykluczenia zakażenia bakteryjnego. U dzieci należy wykonać badanie mikrobiologiczne (posiew z pobranego wymazu) jeżeli czułość stosowanego testu jest  $< 90\%$ . Czułość najczęściej stosowanych w diagnostyce ambulatoryjnej testów jest znacznie niższa.

Drugim powodem przemawiającym za koniecznością wykonywania badań mikrobiologicznych jest zwiększający się odsetek bakterii (paciorkowców grupy A) opornych na makrolidy.

**KONSULTANT KRAJOWY  
w dziedzinie Pediatrii  
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska**